

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت بهداشت (گروه بیماریهای واگیر)
جدول اطلاعات کلی انواع واکسنهای کرونا جهت مراقبین سلامت

ردیف	نام واکسن	کشور سازنده	زنجیره سرد	فاصله بین دو نوبت واکسن	سن مجاز تزریق واکسن	موارد منع مصرف					محل تزریق واکسن	مقدار دز واکسن برای تزریق به هر نفر	مدت زمان نگهداری در دمای اتاق داخل کلد باکس	شکل واکسن در نوبت اول و دوم	تعداد دز واکسن در هر ویال	ملاحظات
						سابقه واکنشهای حساسیتی شدید	بیماری حاد یا بدون تب	افراد زیر 18 سال	مادر شیرده	مادر باردار						
1	اسپوتنیک V	روسیه	منفی 20	28 روز	بالای 18	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	تزریق عضلانی عضله دلتوئید	0.5	در دمای اتاق 15- در 10 دقیقه آب میشود حداکثر 2 ساعت	نوبت اول آبی رنگ نوبت دوم قرمز رنگ	تک دز	ویال واکسن به ملایمت تکان داده شود
2	بهارات	هند	2-8	28 روز	18-55 سال	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	تزریق عضلانی عضله دلتوئید	0.5	کمتر از 6 ساعت	دونوبت یک شکل	10 دز	ویال واکسن تکان داده شود
3	سینوفارم	چین	2-8	28 روز	18-60	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	تزریق عضلانی عضله دلتوئید	0.5	بعد از باز شدن ویال بلافاصله تزریق شود	دو نوبت یک شکل	تک دز	ویال واکسن قبل از تزریق 3-2 مرتبه تکان داده شود
4	استرازنکا	کره جنوبی	2-8	4 تا 12 هفته	بالای 18	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	*	*	تزریق عضلانی عضله دلتوئید	0.5	پس از باز شدن ویال حداکثر 6 ساعت	دو نوبت یک شکل	10 دز	واکسن به ملایمت تکان داده شود

1- خانم های باردار که در ریسک بالای ابتلا (کارکنان بهداشتی درمانی) و یا عوارض ابتلا به بیماری (دارای بیماری زمینه ای) هستند، واکسن دریافت نمایند. قبل از واکسیناسیون نیاز به تست بررسی بارداری نیست و همچنین تاخیر در بارداری بدلیل واکسیناسیون با این واکسن توسط سازمان بهداشت جهانی توصیه نمی شود.

2- در خصوص خانمهای شیرده، توصیه می شود آن دسته از زنانی که فرزندشان را شیر می دهند اگر در ریسک بالای ابتلا (مانند کارکنان بهداشتی درمانی) و یا عوارض ابتلا به بیماری (دارای بیماری زمینه ای) هستند، واکسینه شده و نیازی به قطع شیردهی پس از واکسیناسیون ندارند.